BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 14 février 1906.

Présidence de M. P. MARCHAL.

M. A. Dodero (de Gênes) assiste à la séance.

Voyages. — Le Secrétaire donne lecture d'une lettre de M. Ch. Alluaud, datée de Roseirès (Haut Nil Bleu), à 680 kilom. de Khartoum, du 21 janvier 1906, et dont voici les principaux passages :

« Au cours de ce voyage, j'ai peu écrit à mes amis entomologistes, c'est que j'ai fort peu de choses à leur dire. Ce Soudan oriental est d'une pauvreté remarquable et la température fort élevée y rend les recherches pénibles. Il y a peu d'habitants et ils sont tellement apathiques qu'il est impossible de compter sur eux pour se faire aider.

Les rives du grand fleuve sont intéressantes : cinq ou six espèces de *Cicindela,* entre autres *C. dongolensis* (très abondante), *C. regalis, C. nilotica,* etc.; beaucoup de *Chlænius,* un gros *Omophron,* deux ou trois espèces de *Mastax,* quantité de petits Carabiques, Staphylins, *Georyssus* et *Heterocerus.*

Pas d'Insectes aquatiques dans le fleuve lui-même, mais ils abondent dans les cuvettes laissées çà et là par la baisse des eaux.

En dehors du fleuve, presque rien, sauf des Buprestides, *Sternocera, Steraspis,* etc. sur les Mimosas épineux, surtout sur l'espèce à tronc rouge vif qui donne une excellente gomme arabique.

En revanche le gros gibier abonde. Tous les jours je tire les Hippopotames et Crocodiles qui pullulent partout. Dans une expédition que je viens de faire vers la frontière d'Abyssinie, j'ai eu beaucoup de peine à me défendre — certaines nuits — des Lions et des troupeaux d'Éléphants.

Je me dispose à redescendre vers Khartoum, à petites journées. Puis je visiterai la Nubie et la haute Égypte en mars, et la basse

Égypte en avril-mai. Je compte être de retour à Paris au commencement de juin. »

Changement d'adresse. — M. E. Felt, State Entomologist, Geological Hall, Albany, N. Y. (États-Unis d'Amérique).

Admissions. — M. Richard Auerbach, libraire-éditeur, Steglitz, près Berlin (Allemagne). *Recherches de Biologie des Coccidées; Morphologie et Biochimie.*

— M. Fouquet, capitaine au 9e régiment d'infanterie coloniale, Hanoï (Tonkin). *Coléoptères et Lépidoptères.*

Présentations. — M. Maurice Barrère, négociant, présenté par M. A. Léveillé. — Commissaires-rapporteurs : MM. J. de Joannis et G.-A. Poujade.

— M. G. Leconte, chirurgien-dentiste, présenté par MM. H. Donckier et le Dr J. Manon. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ph. Grouvelle et J. Magnin.

Legs Constant. — Le Trésorier annonce qu'il a reçu délivrance du legs fait par M. Constant et qu'il est en possession du titre de 500 francs de Rente 3 0/0 provenant de ce legs. — Le montant des arrérages de ce titre de Rente étant destiné à récompenser chaque année un travail entomologique, la Société renvoie à son Conseil l'étude de la réglementation à appliquer à ce nouveau prix.

La Société décide en outre de nommer M. Constant Membre bienfaiteur.

Observations diverses.

Captures. — M. C. Dumont signale, comme nouvelles pour la France, les deux captures suivantes :

1° *Bryophila pineti* Stauding. (*Stett. ent. Zeitg* [1859], p. 212), espèce signalée jusqu'ici de Castille et d'Andalousie seulement, trouvée à St-Guilhem-le-Désert (Hérault), en juin 1904;

2° *Stenia nervosalis* Lucas (Explor. scient. de l'Algérie, III, p. 399, pl. 4, fig. 6), signalée de Mauritanie, capturée à Palavas (Hérault), même date.

Envoi en Amérique de chenilles de **Prothesia chrysorrhoea**. — M. René Oberthür fait connaître, comme suite à la note insérée

dans le *Bulletin de la Société entomologique de France* du 28 juillet dernier, à propos de *Prothesia chrysorrhoea*, qu'il a fait parvenir à M. L. O. Howard, chef du Bureau de l'Entomologie au Département de l'agriculture, à Washington, environ 15.000 nids de chenilles de ce Bombycide.

La plus grande partie de ces nids a été récoltée aux environs de La Châtre (Indre), grâce aux soins très obligeants de notre zélé collègue M. Houlbert, sous-directeur de la station entomologique à la Faculté des Sciences de Rennes; c'est par quantités innombrables qu'on rencontre ces nids actuellement dans toute cette région.

Un autre stock également assez important a été envoyé de Charroux (Vienne).

Il est à espérer que M. Kirkland, qui est spécialement chargé de rechercher les parasites de ce Lépidoptère à Boston, obtiendra des résultats satisfaisants, car il dispose actuellement de matériaux considérables. A la fin de janvier, d'après les renseignements reçus de M. Howard, il aurait réuni près de 100.000 nids de *P. chrysorrhoea* provenant de différents points de l'Europe.

— A ce propos, M. P. Marchal fait observer que, les chenilles d'une localité pouvant contenir des parasites qui ne se rencontrent pas dans une autre, le grand nombre d'échantillons déjà envoyé en Amérique ne doit pas être considéré comme constituant une raison pour ne plus continuer les envois. Outre les nids de *Liparis chrysorrhoea* en hivernation, il reste d'ailleurs à envoyer les chenilles arrivées au terme de leur croissance, ainsi que les chrysalides de la même espèce et surtout celles de *Liparis dispar*, pendant les mois de juin et de juillet de cette année.

Communications.

Descriptions de deux *Polybothris* nouveaux [Col.] de Madagascar

par G. Meyer-Darcis.

Polybothris latissima, nov. sp. — Dessus d'un bronzé violacé, à reflets cuivreux, avec la marge latérale des élytres et l'extrémité de celles-ci doré brillant; dessous d'un vert doré avec les côtés de chacun des segments abdominaux et de la poitrine ainsi que la saillie sternale d'un cuivreux brillant. Tête grande, ponctuée et sillonnée sur le front, très rugueuse et impressionnée entre les yeux. Thorax en trapèze, plus rugueux sur les côtés que sur le disque, qui présente un sillon longitudinal; il est droit à la partie supérieure et sinué à la base. Élytres larges, la marge latérale légèrement aplatie, surtout à l'épaule, atténuées et arrondies à l'extrémité. Elles présentent des stries régulières et ponctuées et des fossettes éparses, cuivreuses dans leur fond et remplies d'une villosité blanchâtre. Dessous rugueux, ponctué ainsi que les pattes; la plaque sternale lisse au milieu et sillonnée sur les bords. — Long. : 46 mill.; larg. : 23 mill.

Madagascar; 1 exemplaire.

P. Theryi, nov. sp. — Espèce voisine, mais distincte de *P. ochreata* Oliv. La forme générale est plus ovulaire, et les élytres arrondies à l'extrémité. Tête bronzé obscur, rugueuse; antennes bronzé clair. Thorax droit à la base, dilaté et arrondi sur les bords; il présente un profond sillon médian finement pointillé dans le fond, la ponctuation d'un cuivreux brillant; le disque est lisse, brillant, à peine ponctué et d'un bronzé obscur à reflets cuivreux; les côtés sont garnis d'une villosité gris cendré d'où émerge une large plaque ovulaire, oblique, d'un cuivreux rouge mat. La même tache se reproduit en dessous sur les bords du prosternum. Élytres rugueuses, à stries ponctuées, d'un noir bleuâtre, avec des bandes obliques et irrégulières d'un cuivreux doré, et deux grandes taches marginales, vers le bord externe, d'un rouge cuivreux brillant. — Dessous rugueux, bronzé obscur et présentant de chaque côté des segments 2, 3 et 4 de l'abdomen une large plaque lisse d'un cuivreux doré éclatant. — Long. : 36 mill.; larg. : 15 mill.

Ankarami, Madagascar; 1 exemplaire.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(deuxième note) (1)

par P. de Peyerimhoff.

4. **Euplectus curvipes**, sp. nov. — *Totus rufescens. Caput vix pronoto latius. Pronotum in longitudinem fossulatum. Abdominis segmenta duo priora striis medium ultra prolongatis notata. Coleoptera striis ante medium evanidis insculpta.* — Signa maris : *tibiae secundi paris* (fig. 2) *versus ad apicem incurvatis et intus dente pervalido armatae. Metasternum in longitudinem excavatum. Sextum ventrale segmentum* (fig. 1) *in medio rescissum, septimum convexum, fovea transversaliter incurvata antice notatum.* — Long. : 1,5 mill.



Euplectus curvipes, nov. sp., ♂.
1. Abdomen vu par la face ventrale. — 2. l'atte intermédiaire.

Allongé et assez grêle. Tête un peu plus large que le prothorax, dépourvue de fossette au vertex, ponctuée latéralement, lisse entre les sillons, qui sont médiocrement enfoncés et convergent légèrement en avant. Pronotum complètement lisse, un peu plus long que large, présentant au premier tiers une fossette médiocre, à peine prolongée en avant. Élytres sensiblement plus longs que larges, beaucoup plus larges que le prothorax et la tête, lisses, à strie dorsale peu profonde, ne dépassant pas le tiers. Stries abdominales divergentes, atteignant les 2/3 de la longueur du segment, écartées à leur base du 1/4 de sa largeur; leur intervalle à peine déprimé.

Espèce très remarquable par l'incurvation et l'épine des tibias chez le mâle. La longueur des stries abdominales et la forme allongée du corps la distinguent également de toutes celles actuellement signalées du Nord-Africain.

Cap Aokas (Constantine). Un seul exemplaire, provenant de la collection Théry, actuellement en ma possession.

5. **Atheta (Meotica) Dechorgnati**, sp. nov. — *Corporis forma et colore similis* A. filariae *Fvl, sed statura majori, capite minore, oculis majusculis, antennis elongatis, coleopterisque longioribus discrepans. Valde gracilis et angusta, nigropicea, abdomine nigrescente, antennis,*

(1) Première Note in *Bull. Soc. ent. de France* [1905], p. 229.

pedibus apiceque testaceis. Caput pronoto angustius, sulcatum. Oculi tertiae temporis circiter aequales. Antennarum articuli penultimi latiores quam longiores duplo, ultimus trinis praecedentibus aequalis. Pronotum haud transversum, versus ad basim attenuatum. Coleoptera pronoto sesquilongiora. Abdomen parallelum. — Sexus differentia *latet.* — Long. : 1,6 mill.

Hab. ad torrentes montanos.

A part les différences signalées, cette espèce reproduit, en plus grand, l'aspect et les principaux caractères d'*A. filaria* Fvl. Elle a été recueillie, entre autres Coléoptères, au début d'avril 1905, sur les bords rocailleux de l'oued bou Abdallah des Mouzaïa (Alger), par le garde des Eaux et Forêts Déchorgnat, habile auxiliaire à qui je suis heureux de la dédier.

A. filaria Fvl a des habitudes différentes : c'est une espèce des prés humides, où elle se tient sous les pierres ou dans la terre. Décrite, entre autres localités, de Tiaret (Oran), je l'ai reprise au Nador de Médéa, et à Zaouïa des Mouzaïa, en compagnie de *Pseudoplectus perplexus* Duv.

Le sous-genre *Meotica* Rey, assez bien caractérisé parmi les *Atheta* par les yeux beaucoup plus petits que les tempes, qui ne sont pas rebordées, les antennes épaisses, et le 5e segment visible de l'abdomen plus long que le 4e, renferme actuellement quatre espèces, dont les caractères peuvent se grouper comme il suit :

1. Forme extrêmement allongée d'*A. subtilissima* Kr. 5e segment d'un tiers au moins plus long que le 4e..... 3.

— Forme médiocrement allongée d'*A. analis* Grav. 5e segment à peine d'un quart plus long que le 4e..... 2.

2. Brunâtre. Yeux petits, égaux à la moitié des tempes. Long. : 1,4-1,8 mill..... *exilis* Er.

— Jaune clair. Yeux très petits, à peine égaux au quart des tempes. Long. : 1,2-1,4 mill..... *indocilis* Heer.

3. Taille très petite (1,2 mill.). Tête aussi large que le prothorax. Avant-derniers articles des antennes 3 fois plus larges que longs, le dernier égalant les 2 précédents. Élytres un peu plus longs que le pronotum..... *filaria* Fvl.

— Taille d'*A. exilis* (1,6 mill.). Tête plus étroite que le prothorax. Avant-derniers articles des antennes 2 fois plus

larges que longs, le dernier dépassant beaucoup en longueur les deux précédents. Élytres une fois et demie plus longs que le pronotum..... *Dechorgnati* m.

Bulletin bibliographique.

BARBER (H. S.) : The Spread of *Sphaeridium scarabaeoides* L. (Col. Hydroph.); (*Proc. Ent. Soc. Wash.*) 1906, 2 p.*

ID : Illustrations of an undetermined Coleopterous Larva; (*loc. cit.*) 1906, 5 p., fig.*

LEISEWITZ (Dr. W.) : Ueber chitinöse Fortbewegungs-Apparate einiger (insbesondere fussloser) Insektenlarven; Munich, 1906, 143 p., fig.*

ID : Ueber die wirtschaftliche Bedeutung unserer Spechte; (*Verh. Ornith. Ges. Bay.*) 1904, 13 p., fig.*

MARQUINEZ (L.) : Essai de Sériciculture en Algérie; Blida, 1905, 31 p., (autogr.).*

ORBIGNY (H. D') : Onthophagides de l'Afrique orientale; (*Ann. Soc. ent. Fr.*) 1905, 156 p.*

RIGNANO (E.) : Sur la transmissibilité des caractères acquis, hypothèse d'une Centro-épigénèse; Paris, 1906, 320 p.*

SIMON (E.) : Arachnida; (*Zool. Rec.*) 1905, 49 p.*

ID : Étude sur les Arachnides recueillis en Patagonie par le Dr F. Silvestri; (*Boll. Zool. Anat. comp.*) 1905, 18 p.

ID : Arachnides de Java recueillis par le Prof. K. Kraepelin en 1904; (*Mitt. Naturh. Mus.*) 1905, 25 p., fig.*

ID : Arachnides des îles Chatham (Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific. Schauinsland 1896-1897); (*Zool. Jahrb.*) 1905, 10 p.*

ID : Études sur les Arachnides recueillis au cours de la Mission Du Bourg de Bozas en Afrique; (*Bull. Mus. Hist. nat.*) 1904, 7 p., fig.*

SILVESTRI (F.) : Contribuzione alla conoscenza biologica degli Imenotteri parassiti. I. Biologia del *Litomastix truncatellus* Dalm. (2a nota preliminare); (*Ann. Scuola Sup. Agr. Port.*) 1906, 51 p., 5 pl., fig.*

TRÄGÅRD (I.) : Monographie des arktischen Acariden; Iena, 1904, 1 pl., 133 fig.*

Académie des Sciences (*C. R. hebdom. des Séances*), 1906, I, 4-6. — ⊙

Annals and Magazine of natural History (*The*), sér. 7, XVII, 97 et 98, 1906. — E. W. L. Holt et W. M. Tattersall : Preliminary Notice of the Schizopoda collected by H. M. S. « Discovery » in the Antarctic Region. — T. D. A. Cockerell : Descriptions and Records of Bees, VII et VIII. — W. T. Calman : Notes on some Genera of the Crustacean Family Hippolytidae. — G. T. Bethune-Baker : New Species of Lycaenidae from British New Guinea. — Descriptions of some new African Butterflies. — G. F. Hampson : On new Thyrididae and Pyralidae, (2 art.). — W. L. Distant : A few undescribed Species of Cicadidae, (2 art.).

Arkiv för Zoologi, II, 4, 1905. — Chr. Aurivillius : Lieutnant A. Schultzes Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika, (5 pl. et fig.). — G. Szépligéti : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun, n° 29, (fig.). — Y. Sjöstedt : Ueber eine Termiten Sammlung aus Kongo und anderen Teilen von Afrika. — E. Mjöberg : Biologiska och morfologiska studier öfver Fårröns insektfauna, (1 pl., fig.). — H. Kolbe : Dynastiden aus Kamerun, gesammelt von Herrn Prof. Y. Sjöstedt. — A. Tullgren : Araneida from the swedish Expedition through the Gran Chaco and the Cordilleras, (10 pl.).

Association française pour l'Avancement des Sciences (*Bulletin mensuel*), décembre 1905. — ⊙

Berliner entomologische Zeitschrift, L, 1905. — J. J. Kieffer : Ueber neuemyrmekophile Hymenopteren. — A. F. Nonfried : Neue Lucaniden. — F. Herrmann : Beitrag zur Kenntniss der Asiliden (Dipt.), (fig.). — O. Thieme : Monographie der Gattung *Pedaliodes* Bull. (Lep. Rhop. Satyr.), (3 pl. n.). — R. Haensch : Neue südamerikanische Ithomiinae meiner Sammlung, (2 pl. n., fig.). — Ziegler : Notice nécrologique sur Bode, (portr.).

Congrès des Sociétés savantes de Paris et des Départements tenu à Alger en 1905 (*Comptes rendus*); Paris, 1905. — Ed. et Et. Sergent : Les Insectes piqueurs, inoculateurs des maladies infectieuses, dans l'Afrique du Nord.

Entomological Society of Washington (*Proceedings*), VII, 2-3, 1905. — D. W. Coquillett : Annual Report of the President. The Linnean Genera of Diptera. — A. D. Hopkins : Notes on some Mexican Scolytidae, with Descriptions of some new Species. — H. G. Dyar : Larva of *Castnia licus* Drury. — A. N. Caudell : Kirby's Catalo-

gue of Orthoptera. — W. F. Fiske : *Catogenus rufus*, a Coleopterous Parasite. — H. G. Dyar : A few Notes on the Strecker Collection. — N. Banks : Descriptions of new American Spiders, (1 pl. n.). — J. L. Webb : Descriptions of a new Species of *Desmocerus* with a synoptic Table of the Genus. — N. Banks : New Trichoptera from Japan, (1 pl. n.). — F. M. Webster : A new Enemy of Timothy. — H. S. Barber : Illustrations of an undetermined Coleopterous Larva, (fig.). — F. Knab : A new Species of *Donacia*. — A. N. Caudell : The Species of the Genus *Chimarocephala* and Descriptions of two new Species of Californian Orthoptera. — H. S. Barber : The Spread of *Sphaeridium scarabaeoides* L. (Col. Hydroph.). — T. D. A. Cockerell : Notes on *Eulecanium Folsomi* King. — N. Banks : Descriptions of some new Mites, (fig.). — A. D. Hopkins : Notes on Scolytid Larvae and their Mouth Parts, (2 pl.). — E. S. G. Titus : Some Notes on the Provancher Megachilidae.

Entomologische Litteraturblätter, 1906, 2.

Entomologisk Tidskrift, 1905, 1-4. — S. Lampa : *Trogosita mauritanica*. — Lokflugan (*Anthomyia antiqua* Mg.), (1 pl. col.). — Apel märgstekeln (*Taxonus glabratus* Fall., *agilis* Klug.). — E. Walgren : Diagnosen neuer Schwedischen Polyneuren. — E. Mjöberg : En för Skandinavien ny *Hydrometra*-Art. — E. Wahlgren : Svensk Insektfauna 11, Diptera. *Nemocera* Form. 1-9, (fig.). — A. Tullgren : Ur den moderna, praktisk entomologiska Litteraturen, III. — Om flugarver på spenat. — A. Roman : Om Lapplands alpina Ichneumonidfauna. — S. Lampa : Några af östergötlands Sällsyntare dagfjärilar. — E. Strand : Faunistik og kritik. Et sidste ord til Hr O. M. Reuter. — E. Mjöberg : Några för vårt Land nya Coleoptera. — Ueber *Cryptophagus pubescens* Strm. und seine Variationen. — H. Nordenström : Om några fynd af sällsyntare parasitstelar från hallandsås och sydostra östergotland åren 1903 och 1904. — S. Lampa : *Ceutorrhynchus chrysanthemi* (Germ.) Gyll. — C. Aurivillius : Hymenoptera. I Aculeata. Fam. 3-6, Vespidae, (fig.).

Entomologist's monthly Magazine (*The*), février 1906. — E. R. Bankes : *Mesophleps silacellus* Hb., a Lepidopterous Genus and Species new to Britain, Sussex. — Rev. F. D. Morice : Help-Notes towards the Determination of British Tenthredinidae, etc., (fig.). — Dr G. Horwath : A new Gall inhabiting Bug from Bengal. — H. J. Dobson : Rare Dragonflies in Norfolk. — R. S. Bagnall : Notes on some Coleoptera imported into our Northern Ports. — G. A. Crawshay :

Further-Notes on the capture of *Amara anthobia* Villa and the comparative morphology of *A. familiaris* Duft., *A. anthobia* and *A. lucida* Duft. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes (*La*), n° 423, 1er janvier et 1er février 1906. — Notes spéciales et locales.

Indiana Academy of Science (*Proceedings*), 1904; 1905. — M. T. Cook : Additions to the List of Gall-producing Insects common to Indiana.

Instructor (*El*), XXII, 7 et 8, 1905.

Katalog literatury naukowej Polskiej, V, 1 et 2, 1905; 1906.

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (*Verhandlungen*), LV, 9-10, 1905. — Fr. Kohl : Zur Kenntniss der Hymenopterengattung *Passaloecus* Schuck, (fig.). — G. Mayr : Hymenopterologischen Miszellen, IV, (1 pl., fig.). — M. Bernhauer : Folge neuer Staphyliniden der paläarktischen Fauna nebst Bemerkungen. — R. Cobelli : Contribuzioni alla Imenotterologia del Trentino.

Mouvement agricole (*Le*), janvier 1906. — Bouvier : La Zoologie agricole, (fig.).

Musée du Congo (*Annales*). — Zoologie, série III. Faune entomologique de l'Afrique tropicale. — Longicornes par A. Lameere : I, Prioninae, II, 1, 1903, (pl. n.). — Buprestides par Ch. Kerremans, I, Introduction. — Julodines, III, 1, 1904, (pl. col.). — Rhynchota aethiopica par H. Schouteden, I, Scutellerinae et Graphosomatinae, I, 1, 1903, (pl. col.). — II, Arminae et Tesseratominae, 1905, (pl. col.).

National Academy of Sciences (*Memoirs*), IX, 1905. — A. S. Packard : Monograph of the Bombycine Moths of North America, including their Transformations and origine of the larval Markings and Armature, part II, (LXI pl.).

Naturalista Siciliano (*Il*), XVIII, 4, 1905. — F. Vitale : Osservazioni su alcune Specie di Rincofori Messinesi. — G. Checchia-Rispoli : L'*Atelecyclus rotundatus* Olivi, fossile nel postpliocene dei dintorni di Palermo, (fig.). — T. de Stefani : Breve descrizione dei Zoocecidii siciliani sino ad oggi conosciuti. — A. Fiori : *Xenonychus rotundatus* Fiori è sinonimo di *Saprinus conjungens* Payk.

Naturaliste (*Le*), 1er et 15 janvier, 1er février 1906. — L. Planet : Observation sur la larve et la nymphe du Procruste chagriné, (fig.). — P. Noël : La mouche de Goloubatss. — P. Chrétien : Histoire naturelle de l'*Adela australis* H. S. — P. Noël : L'*Anobium per-*

tinax. — P. Noël : La Piéride des choux et la diminution du prix du bétail. — H. Coupin : Chronique et nouvelles.

Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire naturelle, VII, 2, 1905. — Miss M. Rathbun : Les Crabes d'eau douce (Potamonidae), 2e partie.

Novitates zoologicae, XII, 3, 1905. — Tables.

N. York Agricultural Experiment Station (*Bull.*), 268-270, 1905. ⊙

Public Museum of the City of Milwaukie (*33th Annual Report of the Board of Trustees*), 1905. — (Planches.)

R. Accademia dei Lincei, 1° *Atti,* 1905, II, 11, 12. — Brunelli : Sulla distribuzione degli occiti nelle regine dei Termitidi infette da Protozoi, (fig.). — 2° *Memorie,* V, 11-13, 1905. ⊙

Revista agronomica, III, 12, 1905; IV, 1, 1906. — J. Verissimo d'Almeida : Notas de pathologia vegetal.

Revista de Medecina tropical, VI, 10, 1905.⊙

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1905, 4, fasc. 2. — Meunier : Les Insectes du Copal fossile, (1 pl. n.).

Rivista coleotterologica Italiana, IV, 1, 1906. — A. Fiori : Revisione delle Specie italiane a me note del genere *Malthodes.* — A. Porta : Recensioni.

Rochester Academy of Science (*Proceedings*), IV, 1905.⊙

Royal Society. 1° *Proceedings,* A, 77, 515; B, 77, 516, 1906. ⊙ — 2° *Philosophical Transactions,* B, 198, 244-245.⊙

Royal Society of South Australia, 1° *Memoirs,* I, 3, 1905.⊙ — 2° *Transactions and Proceedings and Report,* XXIX, 1905. — O. B. Lower : New Australian Lepidoptera (22). — W. H. Baker : Notes on South Australian Decapod Crustacea, II et III, (9 pl.). — O. B. Lower : Description of new Australian Lepidoptera with synonymical Notes (23). — A. M. Lea : Descriptions of Australian Curculionidae, with Notes on Previously described Species, III. — J. G. O. Tepper : Insects collected in N. Western Region of South Australia by H. Basedow, with Descriptions of new Species, II. — T. Blackburn : Further Notes on Australian Coleoptera, with Descriptions of new Genera and Species (XXXV).

Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft (*Mitteilungen*), XI, 3, 1905. — E. Bugnion : L'estomac du Xylocope violet (*Xylocopa violacea* Fab., (4 pl.). — P. Born : Eine hybriden Carabenforma. — I. Bolivar : Les Blattes myrmécophiles. — Ratzer : Catalogue des Lépidoptères du Jura neufchâtelois, par F. de Rougemont. —

Supplément à la Faune des Macrolépidoptères du Valais. — E. Frey-Gessner : Hymenoptera Helvetiae, pp. 245-276.

Sociedad cientifica « Antonio Alzate » (*Memorias y Revista*), XXI, 9-12, 1904; XXII, 1-6, 1905. ⊙

Societas Entomologica, XX, 20 et 1er février 1906. — M. Gillmer : Zur Biologie von *Pamphila palaemon* Pall. und *P. Silvius* Knoch. — L. Kroulikowsky : Beitrag zur Lepidopterenfauna des Gouvernements Wologda.

Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne (*Bulletin*), 1904; 1905. ⊙

Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France (*Bulletin*), IV, 4, 1905. — J. Péneau : Notules hémiptérologiques.

Société Lépidoptérologique de Genève, I, 1, 1905. — A. Pictet : Contribution à l'étude de la Sélection naturelle et de la protection chez les Insectes Lépidoptères. — J.-W.-H. Harrison : Les variations de *Lycaena astrarche* Brgst. dans la Grande-Bretagne, (trad.). — J. Culot : *Satyrus hermione* et *alcyone.* — P.-A.-H. Muschamp : Note sur l'œuf de *Saturnia pavonia* — Dr P. Denso : Ueber Mimicry. — P.-A.-H. Muschamp : Quelques jours à Fusio en juillet 1905. Chasse à l'*Erebia flavo-fasciata,* avec description de l'œuf et de la jeune chenille. — J. Culot : Diagnoses d'aberrations nouvelles de Lépidoptères, (1 pl. col.).

Species des Hyménoptères de France et d'Algérie, fasc. 93, 1906. — IX, Proctotrypides par J.-J. Kieffer, pp. 289-368, pl. XIII-XV.

Union apicole (*L'*), février 1906.

University of Cincinnati Record, 1905, 1906. ⊙

Tijschrift voor Entomologie, 1905, 4. — Verslag van de acht-endertigste wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging gehouden te Rotterdam op zondag, 29 januari 1905. — E. Wasmann : Versuche mit einen Brasilianichen Ameisennest in Holland, (1 pl.). — Zur Myrmecophagie des Gruenspechts. — A.-C. Oudemans : Notes on Acari (14e sér.). Parasitidae, Thrombidae, (3 pl.). — E. Everts : Derde Lijst van soorten en varieteiten nieuw voor de Nederlandsche fauna, sedert de uitgave der « Coleoptera Neerlandica » bekend geworden. — A.-J.-F. Fokker : Twee voor onze Fauna nieuve Hemiptera-Heteroptera.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.